


Manejo de techos en variedades y zonas tempranas

¿Cuándo tapar y cuándo destapar?



Comité de Cerezas



DESTAPAR A TIEMPO

- ✓ Desarrollo vegetativo equilibrado.
- ✓ Mejor fruta.
- ✓ Mayor acumulación de azúcar (°Brix).
- ✓ Iluminación permanente del huerto.
- ✓ Mejor consistencia de calidad de fruta.
- ✓ Mayor aprovechamiento del adelanto fenológico.

MANTENER CUBIERTO

- ✗ Mayor crecimiento vegetativo, fruta blanda y menos azúcar.
- ✗ Aumento de la humedad relativa sobre 55% frena la acumulación de grados-día y se retrasa la cosecha.
- ✗ Mayor expresión vegetativa, por ende más jornadas de poda en verde.
- ✗ Más sombra, por lo tanto, menos inducción floral y menor retorno floral el año siguiente.
- ✗ Fruta de calidad mas inconsistente.

ENTRE USD 1.500 - 2.000 por hectárea al año — Costo de manejo y administración de las cubiertas.

CAÍDA DE CHAQUETA ES EL ESTADO FENOLÓGICO PARA DESTAPAR Y DESCUBRIR EL HUERTO Y LOGRAR EL MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE LA TEMPERATURA Y LA RADIACIÓN